

農場周辺の高病原性鳥インフルエンザのウイルスが非常に多くなっています！

全国的に高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されています。
これまで以上に、本病の発生予防を徹底しましょう！

家きん舎への人や、野生動物によるウイルスの侵入を防ぐことが特に重要です！

発生予防対策の特に重要なポイント

- 農場内や家きん舎周囲の消毒は毎日行いましょう！
- 家きん舎等への出入り時に消毒の実施・長靴の交換が適切にできているか、動線が交差していないか、今一度、点検・確認をお願いします！
- 長靴はしっかり汚れを落としてから消毒し、踏込消毒槽などの消毒薬は少なくとも毎日、汚れたらその都度、交換しましょう！
- 農場内や家きん舎の周囲にはウイルスが侵入する経路が多く存在していますので、今一度、点検・確認をお願いします！

ため池等の水場を意識し、その近くは徹底して消毒！

衛生管理区域内の野生動物対策



池
農場内や家きん舎周囲の消毒は毎日実施

家きん舎入口の人・物対策



専用長靴の設置
交差汚染防止



消毒薬は毎日又は汚れたらその都度交換



長靴は汚れを落としてから消毒

衛生管理区域入口の人・車両・物対策



専用の服・車両・手指・長靴の使用
物品消毒の徹底

家きん舎

家きん舎の野生動物対策



集卵ベルト等の開口部の隙間対策
防鳥ネットや鶏舎破損の補修



◆ 飼養家さんの毎日の健康観察を念入りに行い、異状を見つけた場合は、直ちに最寄りの家畜保健衛生所に連絡してください。

農林水産省HPI「鳥インフルエンザに関する情報」→

