

令和5年度 学校保健統計調査結果（鳥取県） 確報

この調査は、文部科学省が毎年実施している基幹統計調査で、国の確報に併せて鳥取県分を取りまとめました。

○調査の目的

学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的としている。

○調査対象者

幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の調査実施校に在籍する満5歳から17歳(令和5年4月1日現在)までの幼児、児童及び生徒の一部。

1 発育状態調査

- (1) 身長推移は、男女ともに昭和50年代から横ばい傾向となっているが、男子は11歳と14歳、女子は11歳で過去最高であった。(図1-1、図1-2)
- (2) 体重推移は、男子は平成8年度あたりから、女子は平成5年度あたりから横ばい傾向となっているが、女子は11歳で前年度に引き続き過去最高であった。(図2-1、図2-2)
- (3) 肥満傾向児の出現率は、6歳を除くすべての年齢で全国を下回っており、特に9歳は9.05%で全国(11.03%)を1.98ポイント下回った。また、6歳(5.07%)及び8歳(9.06%)で過去最多であった。
- (4) 痩身傾向児の出現率は、6歳、8歳～10歳及び14歳～16歳で全国を上回った。特に15歳は5.25%で全国(3.79%)を1.46ポイント上回った。

2 健康状態調査

- (1) 裸眼視力(1.0未満)の者の割合は、幼稚園が14.7%、小学校が35.3%、中学校が62.7%、高等学校が73.7%で、すべての学校区分で前年度より減少した。(表1)
- (2) 鼻・副鼻腔疾患を持つ者の割合は、幼稚園が0.4%、小学校が21.9%、中学校が17.8%、高等学校が10.1%で、幼稚園以外で全国を上回り、特に小学校で9.52ポイント上回った。(表2)
- (3) むし歯(う歯)の者の割合は、幼稚園が22.2%、小学校が40.1%、中学校が29.6%、高等学校が34.3%で、すべての学校区分で過去最少であった。
- (4) アトピー性皮膚炎の者の割合は、幼稚園が1.7%、小学校が5.4%、中学校が4.9%、高等学校が3.8%で、すべての学校区分で全国を上回った。(表2)
- (5) ぜん息の者の割合は、幼稚園が1.6%、小学校が4.0%、中学校が2.9%、高等学校が1.6%で、すべての学校区分で全国を上回った。(表2)


3 相談員配置状況(児童が悩みや不安を気軽に相談できる地域の人材等)

相談員の定期配置が週4時間以上の割合は、中学校が42.5%、高等学校が9.4%で、全国と比べそれぞれ16.5ポイント、2.3ポイント上回った。

4 スクールカウンセラー配置状況(臨床心理に関し高度に専門的な知識・経験を有する者)

スクールカウンセラーの定期配置が週4時間以上の割合は、高等学校が82.8%で、全国と比べ37.7ポイント上回った。

図1-1 男子、平均身長推移(昭和23年度～)(鳥取県)



(注) グラフの欠落部分は調査未実施のため、連続しない。
また、以降の図についても同様。

図1-2 女子、平均身長推移(昭和23年度～)(鳥取県)




表1 男女別、学校区分別の健康状態平均値の前年度との比較－令和5年度（鳥取県）

(単位:%,ポイント)

区分		計				男子				女子			
		幼稚園	小学校	中学校	高等学校	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	幼稚園	小学校	中学校	高等学校
裸眼視力 1.0未満	令和4年	16.8	35.6	64.9	80.6	16.1	33.4	59.6	79.0	17.5	37.8	70.5	82.1
	令和5年	14.7	35.3	62.7	73.7	x	33.2	57.7	69.6	18.4	37.4	68.1	77.9
	差	-2.1	-0.3	-2.2	-6.9	-	-0.2	-1.9	-9.4	0.9	-0.4	-2.4	-4.2
鼻・副鼻 腔疾患	令和4年	0.2	13.7	18.1	10.3	0.4	16.3	21.9	11.9	-	11.0	14.1	8.6
	令和5年	0.4	21.9	17.8	10.1	0.6	27.1	20.9	12.8	0.2	16.6	14.5	7.2
	差	0.2	8.2	-0.3	-0.2	0.2	10.8	-1.0	0.9	-	5.6	0.4	-1.4
むし歯 (う歯)	令和4年	23.7	42.0	31.7	35.2	27.3	43.5	30.9	33.1	19.8	40.5	32.5	37.4
	令和5年	22.2	40.1	29.6	34.3	22.4	41.7	28.4	32.1	21.9	38.5	30.9	36.5
	差	-1.5	-1.9	-2.1	-0.9	-4.9	-1.8	-2.5	-1.0	2.1	-2.0	-1.6	-0.9
アトピー 性皮膚炎	令和4年	2.2	5.8	4.1	3.3	2.1	6.0	4.1	3.6	2.4	5.6	4.0	2.9
	令和5年	1.7	5.4	4.9	3.8	1.9	5.7	5.5	4.3	1.5	5.2	4.2	3.4
	差	-0.5	-0.4	0.8	0.5	-0.2	-0.3	1.4	0.7	-0.9	-0.4	0.2	0.5
ぜん息	令和4年	1.2	4.4	2.9	1.5	1.9	5.2	3.3	1.6	0.4	3.6	2.5	1.3
	令和5年	1.6	4.0	2.9	1.6	2.3	5.0	3.2	1.9	0.9	3.0	2.4	1.3
	差	0.4	-0.4	0.0	0.1	0.4	-0.2	-0.1	0.3	0.5	-0.6	-0.1	0.0

(注) この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載があった者)の割合の推定値を示したものである。

「X」はサンプル数が少なく、誤差が大きい(標準誤差が5%以上)ため統計数値を公表しない。また、「-」は該当数値なし。

むし歯(う歯)には、処置完了者も含む。

表2 男女別、学校区分別の健康状態平均値の全国との比較－令和5年度

(単位:%,ポイント)

区分		計				男子				女子			
		幼稚園	小学校	中学校	高等学校	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	幼稚園	小学校	中学校	高等学校
裸眼視力 1.0未満	鳥取県	14.70	35.30	62.70	73.70	x	33.20	57.70	69.60	18.40	37.40	68.10	77.90
	全国	22.92	37.79	60.93	67.80	22.81	35.37	57.90	65.48	23.05	40.32	64.12	70.08
	差	-8.22	-2.49	1.77	5.90	-	-2.17	-0.20	4.12	-4.65	-2.92	3.98	7.82
鼻・副鼻 腔疾患	鳥取県	0.40	21.90	17.80	10.10	0.60	27.10	20.90	12.80	0.20	16.60	14.50	7.20
	全国	2.99	12.38	10.48	7.60	3.69	15.06	11.91	8.43	2.26	9.57	8.99	6.74
	差	-2.59	9.52	7.32	2.50	-3.09	12.04	8.99	4.37	-2.06	7.03	5.51	0.46
むし歯 (う歯)	鳥取県	22.20	40.10	29.60	34.30	22.40	41.70	28.40	32.10	21.90	38.50	30.90	36.50
	全国	22.55	34.81	27.95	36.38	23.40	36.05	26.46	34.91	21.68	33.52	29.50	37.92
	差	-0.35	5.29	1.65	-2.08	-1.00	5.65	1.94	-2.81	0.22	4.98	1.40	-1.42
アトピー 性皮膚炎	鳥取県	1.70	5.40	4.90	3.80	1.90	5.70	5.50	4.30	1.50	5.20	4.20	3.40
	全国	1.48	3.25	2.99	2.39	1.64	3.43	3.18	2.57	1.32	3.07	2.79	2.21
	差	0.22	2.15	1.91	1.41	0.26	2.27	2.32	1.73	0.18	2.13	1.41	1.19
ぜん息	鳥取県	1.60	4.00	2.90	1.60	2.30	5.00	3.20	1.90	0.90	3.00	2.40	1.30
	全国	1.15	2.87	2.00	1.50	1.38	3.43	2.34	1.66	0.91	2.28	1.65	1.33
	差	0.45	1.13	0.90	0.10	0.92	1.57	0.86	0.24	-0.01	0.72	0.75	-0.03

(注) この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載があった者)の割合の推定値を示したものである。

「X」はサンプル数が少なく、誤差が大きい(標準誤差が5%以上)ため統計数値を公表しない。また、「-」は該当数値なし。

むし歯(う歯)には、処置完了者も含む。