



誤 飲

まずは、落ち着いて、何をどのくらいの量、飲んだか、確認しましょう。(P36～37)

次のうち、どの症状が見られますか？

- 意識がおかしい。
- 呼吸が苦しそう。
- けいれんを起こした。

この欄に1つ以上
「はい」がある

救急車を呼びましょう!

- 顔が悪い。
- 吐き気もしくは吐いた。
- 飲み込んだ直後に激しく咳き込んだ。

左の欄に「はい」はなく、
この欄に「はい」がある

休日夜間急患診療所を
受診しましょう。

診療時間外の場合

- 顔色もよく、吐き気もなく、息苦しさもない。

この欄にしか
「はい」がない

様子を見ながら、翌日、
かかりつけ医を受診しましょう。

症状が急変した場合

救急電話相談ダイヤルに相談しましょう。

名 称：とっとり子ども救急ダイヤル

電話番号：#8000 (ダイヤル回線・IP電話の場合は0857-26-8990)

相談受付時間：24時間365日

子どもが誤飲した時の応急処置

1. すぐに受診しなければならないもの (絶対に吐かせてはいけないもの)

飲み込んだ物	危険度	水分を取らせてもよいもの(※)
灯油・ガソリン	★★★★	何も飲ませてはいけない
マニキュア・除光液	★★★★	
液体蚊取り	★★★★	
塩素系漂白剤	★★★★	水分を取らせてもよい
洗剤(トイレ・排水パイプ用)	★★★★	
生石灰(乾燥剤)	★★★★	

2. すぐに受診しなければならないもの

飲み込んだ物	危険度	水分を取らせてもよいもの(※)
ボタン電池	★★★★	何も飲ませてはいけない
複数の磁石	★★★★	
釘、画鋸など鋭利なもの	★★★★	
たばこ	★★	水分を取らせてもよい
ハウ酸団子	★★★★	
香水	★★	
しょうのう(防虫剤)	★★★★	何も飲ませてはいけない
ナフタリン(防虫剤)	★★★★	○水 ×牛乳
油性絵の具	★★★★	○水 ×牛乳

※水分を飲ませることは必須ではなく、飲ませることは吐くリスクがあることに留意しましょう。

また、痛みや吐き気など、症状がある時は何も飲ませてはいけません。

3. 少量であれば、あまり心配しなくてよいもの

→ただし、何か症状があった場合は、休日夜間急患診療所を受診しましょう。

飲み込んだ物	危険度	水分を取らせてもよいもの(※)
紙	★	水分を取らせてもよい
クレヨン	★	
水彩絵の具	★	
粘土	★	
シャボン玉液	★	
化粧水	★	
クリーム・口紅	★	
石鹸	★	
シャンプー	★	
台所用洗剤	★★★	
芳香剤	★	
シリカゲル(乾燥剤)	★	
体温計の水銀	★	
蚊取り線香	★	
パラジクロロベンゼン(防虫剤)	★★★★	○水 ×牛乳

※水分を飲ませることは必須ではなく、飲ませることは吐くリスクがあることに留意しましょう。

また、痛みや吐き気など、症状がある時は何も飲ませてはいけません。



相談窓口

中毒情報 (財) 日本中毒情報センター

中毒110番 (情報提供料 無料)

大 阪 **072-727-2499** (365日 24時間)

つくば **029-852-9999** (365日 24時間)

タバコ誤飲事故専用電話

(情報提供料 無料、自動音声応答による一般向け情報)

大 阪 **072-726-9922** (365日 24時間)



観察のポイント

- いつ、何を、どれくらい飲んだかを確認する。
- 意識はどうか？
- 呼吸は規則正しいか？
- 顔色はよいか？
- 吐いていないか？



お医者さんに伝えてほしいこと

- いつ、何を、どれくらいの量、飲みましたか？
- 吐きましたか？
- 飲み残しの容器や吐いたもの、薬などは空き箱または説明書を受診の際にもってきてください。

意識

頭痛

耳を痛がる

ウンチが変

おしっこ

発疹

誤飲