

# チャノコカクモンハマキの誘殺消長(ブドウ、園試砂丘地研究センター調査)

鳥取県病害虫防除所

令和8年5月下旬現在




図1 フェロモントラップにおけるチャノコカクモンハマキの誘殺消長

## 【チャノコカクモンハマキ (砂丘研露地)】

月	4			5			6			7			8			9			10			11		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
本年	13	97	175	121	37	3																		
平年(H27-R6)	11.1	42.5	67.6	67.0	40.2	8.5	4.1	45.3	61.5	41.7	16.5	39.7	44.0	24.6	17.0	31.8	73.2	80.2	73.4	44.1	29.7	21.4	6.1	3.7

## 【チャノコカクモンハマキ (砂丘研無加温)】

月	4			5			6			7			8			9			10			11		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
本年	0	2	5	4	4	0																		
平年(H27-R6)	0.2	2.4	1.8	2.7	2.7	0.1	0.2	2.0	8.9	5.7	2.3	11.4	12.5	4.3	4.6	7.8	16.8	18.5	21.6	16.8	11.5	15.1	4.9	2.2