

ELVOスコア評価チェックリスト

JSS※1/JAAM※2標準LVOスケール（主幹動脈閉塞予測スケール）

傷病者情報

傷病者氏名： _____ 評価日時： _____ 年 月 日 時 分

性別：男・女 年齢： _____ 歳 評価者所属・氏名： _____ .

評価項目

1.不整脈(心房細動など)

観察方法：橈骨動脈または頸動脈を触知、または脈の規則性を確認

陽性(不整脈あり) 陰性(不整脈なし)

判定のポイント：触知で判断できない場合、心電図モニターを装着して確認する

2.眼球の共同偏視

観察方法：患者の眼球の向きを観察し、一方向への偏視がないか確認

陽性(偏視あり) 陰性(偏視なし)

判定のポイント：眼球が一方向を向き続け、正中位に戻らない場合は陽性

3.半側空間無視

観察方法：両側から声をかけたり、視覚刺激を与えて反応を確認

陽性(無視あり) 陰性(無視なし)

判定のポイント：片側からの刺激に明らかに反応が乏しい場合は陽性

4.失語

観察方法：簡単な質問や命令(「目を閉じて」など)に対する反応を確認

陽性(失語あり) 陰性(失語なし)

判定のポイント：言葉が全く出ない、または極めて不適切な返答の場合は陽性

5.顔面麻痺

観察方法：笑顔を作ってもらい、口角の左右対称性を確認

陽性(麻痺あり) 陰性(麻痺なし)

判定のポイント：明らかな左右差(片側の口角が上がらない)がある場合は陽性

6.上肢麻痺

観察方法：両腕を前方に挙上してもらい、保持能力を確認

陽性(麻痺あり) 陰性(麻痺なし)

判定のポイント：片側の腕が上がらない、またはすぐに下がる場合は陽性

合計スコア

陽性項目数： _____ /6項目 (3項目以上陽性でPSC※3選定)

※1 Japan Stroke Society

※2 Japanese Association for Acute Medicine

※3 Primary Stroke Center(一次脳卒中センター)