


ナラ枯れ被害丸太の取り扱いについて

被害木表面の特徴



カシノナガキクイムシが穴をあけ、木屑をたくさん出しています。

鳥取市安蔵 コナラ被害木

今、県内ではコナラやミズナラ(ナラ類)が枯れています。

これは、カシノナガキクイムシが木に穴を開け、体に付着したナラ菌(カビの一種)により、水切れ状態となり、まもなく葉が変色し、枯損するためおこります。

カシノナガキクイムシの被害木を放置したり、移動させたりすると、翌年、そこを中心に、被害が拡大してしまいます。

被害拡大を防ぐためには、被害木を早く見つけ、薬剤処理して、中にいるカシノナガキクイムシの幼虫を駆除しなければなりません。

カシノナガキクイムシは、ナラ類以外にも、カシ・シイ類などにも、被害をあたえることがあります。

ナラ枯れ被害丸太は被害の感染源になります。

鳥 取 県

カシノナガキクイムシによるナラ枯れ

カシノナガキクイムシは、ナラ・シイ・カシ類の幹に穴をあけ、その中で菌を栽培して幼虫を育てるキクイムシです。ナラ枯れの病原菌は、餌になる他の菌と一緒にカシノナガキクイムシによって木の中に持ち込まれます。

夏に真っ赤に紅葉したかのようなナラ枯れが被害の大きな特徴です。しかし、カシノナガキクイムシに加害されても**枯れない木**もあります。このような木や**被害を受けた丸太**などは翌年の**被害の感染源**となります。



鳥取市佐治町のナラ枯れ被害状況(2008年)

被害丸太の移動はやめて下さい。



①一見被害材と分かりませんが、よく見ると表面に所々1.5mm程度の穴が開いています。



②木口が黒く変色しています。

このような被害木をほだ木に使わないでください。

連絡先

- 市町村役場農林・産業関係課
- 中部総合事務所 農林局 林業振興課 0858-23-3182
- 西部総合事務所 農林局 農林業振興課 林業振興室 0859-31-9677
- 西部総合事務所 日野振興センター 日野振興局 農林業振興課 0859-72-2021
- 鳥取県農林水産部 森林・林業振興局 森林づくり推進課 0857-26-7305