

むきばんだ花だより

タブノキは雌雄異株？それとも雌雄同株？

2015.5.9

芽鱗

混芽

葉芽

タブノキの冬芽は典型的な芽鱗です。晩秋から芽を付け春まで殆ど変化しませんが、春の盛りになるとその変化の著しさは驚くばかりです。

遺跡としては広い妻木晩田ですが、植生分布から見れば狭い領域です。しかしその見て歩ける範囲にも、さまざまな成育過程を見れるのはとても愉快です。春に展開した様子から、芽鱗には葉芽と混芽(花芽+葉芽)が分かります。葉芽と混芽は木によって違うのでしょうか？

シナアブラギリ

花の形がキリとは違うのになぜ(シナ)アブラギリ？
葉っぱの形が似ている別種の植物なんですね。
キリ：シソ目キリ科
(シナ)アブラギリ：
トウダイグサ目トウダイグサ科

季節はずれの紅葉(カクレミノ)

落葉樹は秋に紅葉して落葉しますが、常緑樹は春の新しい葉が出るのとほぼ同時に旧葉が落ちて、旧葉と新葉が一斉に短時間ですべて入れ替わるタイプと春の新しい葉が展開してから、古葉が夏までかけてだらだらと落葉し、葉の寿命が2~3年と割合に長いことが多いタイプがあります。

カクレミノは後者のタイプです。
意外と鮮やかな隠れ紅葉です。

カクレミノ

1/4

散策中、話題になった植物たち

1、ノゲシ (ハルノノゲシ) とオニノゲシの見分け方



ノゲシ (ハルノノゲシ)



オニノゲシ

特徴は茎を抱く葉にあり

葉の基部はとがった耳型で茎を抱く。
葉にはとげがあるが柔らかで触っても痛くない。

葉の基部は半月状に茎を抱く。
葉は頑丈でとげとげしく、触ると痛い。

2、珍しいお客様を見つけた！ 外来雑草



タチオオバコ



3、クサギは何の匂い？ 只今試嗅中



お～
ビタミン剤
の匂いです！

むきばんだを彩る黄色い草花



ブタナ（別名：たんぽぼもどき）
キク科・多年生・タンポポに似るが
葉の両面や縁に剛毛が生える。




ニガナ（苦菜）
キク科・多年生・切ると苦味のある白汁が出る。



コウゾリナ（髪剃菜）
キク科・越年生・全体に毛があり
触るとざらつく。

むきばん日和 草木染め体験（5月6日実施）

遠い弥生時代に思いをはせ 村人の気分で草木染めを体験して頂きました。
植物はオオバヤシャブシ、 媒洗剤は鉄、素敵な色に染まり感動でした。



私の好きなこと

洞ノ原から日本海を眺め、国引き神話に思いを馳せること（A・Mさん）



★むきばんだを歩く会★

- 指導:驚見寛幸先生(鳥取県自然観察指導員)
- 毎月第1土曜日午前9時30分～正午
- 入会金 2000円 毎回資料代 300円 いつでも、どなたでも入会可能です
- 問い合わせ:むきばんだ応援団「むきばんだをあるく会」